LISTA DEGLI INDICATORI AMD

Rev. 10 del 21 Ottobre 2025

I calcoli sono riferiti al totale dei diabetici attivi nel periodo selezionato. Il paziente è considerato attivo se, nel periodo selezionato, ha almeno un campo del File Dati tra i seguenti: prescrizione terapeutica diabetologia (sia farmacologica che di sola dieta) e almeno un altro parametro tra peso corporeo e pressione arteriosa.

Gli indicatori si riferiscono ad un periodo selezionato (anno indice). Il valore P indica l'utilizzo dei dati storici, cioè anche riferiti ad un periodo antecedente all'anno indice.

Tutti gli Indicatori vengono valutati separatamente per diabete di tipo 1 (DM1), diabete di tipo 2 (DM2) e per diabete gestazionale (GDM).

Gli indicatori contrassegnati con l'asterisco (*) sono indicatori condivisi con l'International Diabetes Federation (IDF); gli indicatori contrassegnati con il doppio asterisco (**) sono indicatori condivisi con l'IDF sebbene, a parità di parametro clinico considerato, i cut-off identificati siano diversi.

Non tutti gli indicatori previsti nella lista sono stati calcolati perché alcuni non sono ancora valutabili

Indicatori descrittivi generali e di volume di attività

	Soggetti con diabete visti nel periodo
	Distribuzione per classificazione tipo di diabete (DM1, DM2, GDM, LADA, MODY, Diabete secondario, Altro)
*	Numero primi accessi totale e per tipo di diabete
	Numero nuove diagnosi totale e per tipo di diabete
	Distribuzione per sesso della popolazione assistita totale e per tipo di diabete
	Età media della popolazione assistita totale e per tipo di diabete
	Distribuzione della popolazione assistita per 9 classi di età (<=18.0, 18.1-25.0, 25.1-35.0, 35.1-45.0, 45.1-55.0, 55.1-65.0, 65.1-75.0, 75.1-85.0, > 85) totale e per tipo di diabete
	Durata media del diabete
	Distribuzione della popolazione assistita per 5 classi di durata del diabete (>= 2.0, 2.1-5.0, 5.1- 10.0, 10.1-20.0, >20.0)
	Distribuzione per etnia della popolazione assistita totale e per tipo di diabete

Diabete di tipo 1

	Indicatori di processo
	Numero medio di visite nel periodo per gruppo di trattamento (MDI, schemi insulina+ altri farmaci ipoglicemizzanti, CSII, SAP, sistemi IBRIDI)
*	% Soggetti con almeno una determinazione di HbA1c
	% Soggetti con almeno due determinazioni di HbA1c
*	% Soggetti con almeno una valutazione del profilo lipidico
	% Soggetti con almeno una misurazione della pressione arteriosa (PA)
	% Soggetti monitorati per albuminuria
*	% Soggetti monitorati per creatininemia
*	% Soggetti monitorati per il piede
*	% Soggetti monitorati per retinopatia diabetica
	% Soggetti con almeno una determinazione di HbA1c e del profilo lipidico e della microalbuminuria e una misurazione della PA nel periodo
	% Soggetti monitorati per transaminasi
	% Soggetti monitorati per gammaGT
	% Soggetti con HSI valutabile
	% Soggetti con FIB-4 valutabile
	Indicatori di risultato intermedio
	HbA1c media e d.s. (ultimo valore)
	HbA1c media e d.s. (ultimo valore) per tipo di trattamento (MDI, schemi insulina+ altri farmaci ipoglicemizzanti, CSII, SAP, sistemi IBRIDI)
	Andamento per 8 classi della HbA1c (<=6.0, 6.1-6.5, 6.6-7.0, 7.1-7.5, 7.6-8.0, 8.1-8.5, 8.6-9.0, >9.0%) (<=42, 43-48, 49-53, 54-59, 60-64, 65-69, 70-75, >75 mmol/mol)

	Andamento per 8 classi della HbA1c (<=6.0, 6.1-6.5, 6.6-7.0, 7.1-7.5, 7.6-8.0, 8.1-8.5, 8.6-9.0, >9.0%) (<=42, 43-48, 49-53, 54-59, 60-64, 65-69, 70-75, >75 mmol/mol) nei soggetti di età >=75 anni
**	% Soggetti con HbA1c <=7.0% (53 mmol/mol)
**	% Soggetti con HbA1c >8.0% (64 mmol/mol)
	TIR (valori glicemici compresi tra ≥70 e ≤180 mg/dl) su 14 gg (mediana e IQR)
	% Soggetti con TIR >70%
	TAR (valori glicemici >180 mg/dl) su 14 gg (mediana e IQR)
	% Soggetti con TAR <25%
	TBR1 (valori glicemici compresi tra ≥ 54 e <70 mg/dl) ~~(TBR1)~~ su 14 gg (mediana e IQR)
	% Soggetti con TBR1 <4%
	TBR2 (valori glicemici <54 mg/dl) ~~(TBR2)~~ su 14 gg (mediana e IQR)
	% soggetti con TBR2 <1%
	CV su 14 gg (mediana e IQR)
	% soggetti con CV >36 (indicatore negativo)
	Colesterolo totale medio e d.s. (ultimo valore)
	Colesterolo LDL (C-LDL) medio e d.s. (ultimo valore)
	Colesterolo HDL (C-HDL) medio e d.s. (ultimo valore)
	Trigliceridi medi e d.s. (ultimo valore)
	Andamento per 5 classi del C-LDL (<55.0, 55.0-69.9, 70.0-99.9, 100.0-129.9, >=130)
**	% Soggetti con C-LDL <70mg/dL oppure non HDL-C <100 mg/dL
**	% Soggetti con C-LDL >=100 mg/dL o non HDL-C>= 130 mg/dL
	Pressione arteriosa sistolica (PAS) media e d.s. (ultimo valore)
	Pressione arteriosa diastolica (PAD) media e d.s. (ultimo valore)

	Andamento per 7 classi della PAS (<130, 130-135, 136-139, 140-150, 151-160, 161-199, >=200 mmHg)
	Andamento per 6 classi della PAD (<80, 80-85, 86-89, 90-100, 101-109, >=110 mmHg)
*	% Soggetti con PA <130/80 mmHg
**	% Soggetti con PA >=140/90 mmHg
	% Soggetti con HbA1c <= 7.0% (53 mmol/mol) e con C-LDL < 70 mg/dL e con PA <130/80 mmHg
	Andamento per 7 classi del BMI (<18.5; 18.5-24.9; 25.0- 26.9; 27.0-29.9; 30.0-34.9; 35.0-39.9; >=40 Kg/m^2)
	% Soggetti con BMI >=30 Kg/m^2
	% Soggetti con rapporto circonferenza vita/altezza >=0,5
	Andamento per 6 classi del filtrato glomerulare (GFR) secondo KDIGO (<15; 15.0-29.9; 30.0-44.9; 45.0-59.9; 60.0-89.9; >=90.0 ml/min/1.73m^2
	% Soggetti con GFR <60 ml/min/1.73m^2
	% Soggetti con albuminuria (normo, micro, macroalbuminuria)
	Andamento per classi di malattia renale (Classi KDIGO)
	% Soggetti con MASLD
	% Soggetti con MASH
*	% Soggetti fumatori
	Indicatori di intensità/appropriatezza del trattamento farmacologico
	Distribuzione dei pazienti per gruppo di trattamento ipoglicemizzante (MDI, schemi insulina+altri farmaci ipoglicemizzanti, CSII, SAP, sistemi IBRIDI)
	Distribuzione dei pazienti per tipo e generazione di insulina basale e rapida
	Distribuzione dei pazienti per tipo di device per l'automonitoraggio domiciliare della glicemia (solo glucometro, FGM, CGM)
	Distribuzione dei livelli di HbA1c in base allo schema di trattamento (MDI, schemi insulina+altri farmaci ipoglicemizzanti, CSII, SAP, sistemi IBRIDI)

	Distribuzione dei livelli di HbA1c in base al tipo di device per l'automonitoraggio domiciliare della glicemia (glucometro, FGM, CGM)
	% Soggetti trattati con ipolipemizzanti
	Distribuzione dei pazienti per classe di farmaco ipolipemizzante (statine, fibrati, omega3, ezetimibe, acido bempedoico, PCSK9i, siRNA)
	% Soggetti non trattati con ipolipemizzanti nonostante valori di C-LDL >=100-mg/dL
	% Soggetti con C-LDL>=100 mg/dL nonostante il trattamento con ipolipemizzanti
	% Soggetti trattati con antiipertensivi
	Distribuzione dei pazienti per classi di farmaco antiipertensivo (diuretici, ACE-inibitori, sartani, calcioantagonisti, betabloccanti, alfabloccanti)
	% Soggetti non trattati con antiipertensivi nonostante valori di PA >=140/90 mmHg
	% Soggetti con PA >=130/80mmHg nonostante il trattamento con antiipertensivi
	% Soggetti non trattati con ACE-inibitori e/o Sartani nonostante la presenza di albuminuria (micro/macroalbuminuria)
	% Soggetti con evento cardiovascolare pregresso (infarto e/o ictus e/o rivascolarizzazione coronarica e/o periferica, bypass coronarico e/o periferico) in terapia antiaggregante piastrinica
	Indicatori di esito finale
	Distribuzione dei pazienti per grado di severità della retinopatia diabetica su totale monitorati per retinopatia (assente, non proliferante, proliferante, laser-trattata, cecità da diabete; maculopatia)
	% Soggetti con ulcera o gangrena o osteomielite del piede verificatasi nel periodo
p	% Soggetti con storia di amputazione minore
p	% Soggetti con storia di amputazione maggiore
p	% Soggetti in dialisi
p	% Soggetti con storia di infarto del miocardio
p	% Soggetti con storia di scompenso cardiaco
	Andamento per classi di FE (LVEF <=40%; LVEF 41-49%; LVEF >=50%)

p	% Soggetti con storia di ictus
	% Soggetti con storia di TIA
p	% Soggetti con storia di malattia cardiovascolare
	% Soggetti con almeno un episodio di ipoglicemia severa verificatosi nel periodo
	% Soggetti con almeno un episodio di ipoglicemia severa verificatosi nel periodo seguito da accesso al pronto soccorso o chiamata al 118 o ricovero ospedaliero
	Indicatori di qualità di cura complessiva
	Score Q medio nella popolazione assistita
	% Soggetti con score Q <15
	% Soggetti con score Q >25

Diabete di tipo 2

	Indicatori di processo
	Numero medio di visite nel periodo per gruppo di trattamento: solo dieta, secretagoghi, insulina, altri ipoglicemizzanti, insulina+altri ipoglicemizzanti
*	% Soggetti con almeno una determinazione di HbA1c
	% Soggetti con almeno due determinazioni di HbA1c
*	% Soggetti con almeno una valutazione del profilo lipidico
	% Soggetti con almeno una misurazione della pressione arteriosa (PA)
	% Soggetti monitorati per albuminuria
*	% Soggetti monitorati per creatininemia
*	% Soggetti monitorati per il piede
*	% Soggetti monitorati per retinopatia diabetica

	% Soggetti monitorati per transaminasi
	% Soggetti monitorati per gammaGT
	% Soggetti con HSI valutabile
	% Soggetti con FIB-4 valutabile
	% Soggetti con almeno una determinazione di HbA1c e del profilo lipidico e della microalbuminuria e una misurazione della PA nel periodo
	Indicatori di risultato intermedio
	HbA1c media e d.s. (ultimo valore)
	HbA1c media e d.s. (ultimo valore) per tipo di trattamento: solo dieta, secretagoghi, insulina, altri ipoglicemizzanti (metformina, acarbosio, pioglitazone, DPP4i, SGLT2i, GLP1-RA, GLP1-RA+GIP, GLP1-RA+SGLT2i), insulina + altri farmaci ipoglicemizzanti
	Andamento per 8 classi della HbA1c (<=6.0, 6.1-6.5, 6.6-7.0, 7.1-7.5, 7.6-8.0, 8.1-8.5, 8.6-9.0, >9.0%) (<=42, 43-48, 49-53, 54-59, 60-64, 65-69, 70-75, >75 mmol/mol)
	Andamento per 8 classi della HbA1c (<=6.0, 6.1-6.5, 6.6-7.0, 7.1-7.5, 7.6-8.0, 8.1-8.5, 8.6-9.0, >9.0%) (<=42, 43-48, 49-53, 54-59, 60-64, 65-69, 70-75, >75 mmol/mol) nei soggetti di età >=75 anni
**	% Soggetti con HbA1c <=7.0% (53 mmol/mol)
**	% Soggetti con HbA1c >8.0% (64 mmol/mol)
	Colesterolo totale medio e d.s. (ultimo valore)
	Colesterolo LDL (C-LDL) media e d.s. (ultimo valore)
	Colesterolo HDL (C-HDL) media e d.s. (ultimo valore)
	Trigliceridi media e d.s. (ultimo valore)
	Andamento per 5 classi del C-LDL (<55; 55-69.9; 70.0-99.9, 100.0-129.9, >=130.0)
**	% Soggetti con C-LDL <70 mg/dL oppure non HDL-C <100 mg/dL
**	% Soggetti con C-LDL >=100 mg/dL o non HDL-C >=130 mg/dL
	Pressione arteriosa sistolica (PAS) media e d.s. (ultimo valore)
	Pressione arteriosa diastolica (PAD) media e d.s. (ultimo valore)

	Andamento per 7 classi della PAS (<=130, 131-135, 136-139, 140-150, 151-160, 161-199, >=200 mmHg)
	Andamento per 6 classi della PAD (<=80, 81-85, 86-89, 90-100, 101-109, >=110 mmHg)
*	% Soggetti con PA <130/80 mmHg
**	% Soggetti con PA >=140/90 mmHg
	% Soggetti con HbA1c <= 7.0% (53 mmol/mol) e con C-LDL < 70mg/dL e con PA <130/80 mmHg
	Andamento per 7 classi del BMI (<18.5; 18.5-24.9; 25.0- 26.9; 27.0-29.9; 30.0-34.9; 35.0-39.9; >=40 Kg/m^2)
	% Soggetti con BMI >=30 Kg/m^2
	% Soggetti con rapporto circonferenza vita/altezza >=0,5
	Andamento per 6 classi del filtrato glomerulare (GFR) secondo KDIGO (<15, 15.0-29.9; 30.0-44.9; 45.0-59.9; 60.0-89.9; >=90.0 ml/min/1.73m^2
	% Soggetti con GFR <60 ml/min/1.73m^2
	% Soggetti con albuminuria (normo, micro, macroalbuminuria)
	Andamento per classi di malattia renale (Classi KDIGO)
	% Soggetti con MASLD
	% Soggetti con MASH
*	% Soggetti fumatori
	Indicatori di intensità/appropriatezza del trattamento farmacologico
	Distribuzione dei pazienti per gruppo di trattamento ipoglicemizzante (solo dieta, farmaci ipoglicemizzanti eccetto insulina, insulina+altri farmaci ipoglicemizzanti, insulina)
	Distribuzione dei pazienti per classe di farmaco ipoglicemizzante (metformina, secretagoghi, glitazonici, DPP4i, GLP1-RA iniettivi e orali, GLP1-RA+GIP, inibitori alfa glucosidasi, SGLT2i, insulina basale, insulina rapida)
	Distribuzione dei pazienti per intensità di trattamento ipoglicemizzante (solo dieta, monoterapia non insulinica, doppia terapia non insulinica, tripla terapia non insulinica o più, insulina basale ± altri ipoglicemizzanti eccetto insulina rapida, insulina basale + insulina rapida ± altri ipoglicemizzanti)

	% Soggetti trattati con GLP1-RA + SGLT2i o con GLP1-RA + GIP + SGLT2i
*	% Soggetti con valori di HbA1c <=7.0% (53 mmol/mol) in sola dieta
	% Soggetti in sola dieta nonostante valori di HbA1c >8.0% (64 mmol/mol)
*	% Soggetti non trattati con insulina nonostante valori di HbA1c >=9.0% (75 mmol/mol)
	% Soggetti non trattati con GLP1-RA e/o SGLT2i e/o GLP1-RA+GIP nonostante HbA1c >=9.0% (75 mmol/mol)
	% Soggetti con HbA1c >=9.0% (75 mmol/mol) nonostante il trattamento con insulina
	% Soggetti con HbA1c >=9.0% (75 mmol/mol) nonostante il trattamento con GLP1-RA e/o SGLT2i e/o GLP1-RA+GIP
	% Soggetti con età >=75 anni e HbA1c <7% (53 mmol/mol) trattati con secretagoghi
	% Soggetti trattati con ipolipemizzanti
	Distribuzione dei pazienti per classe di farmaco ipolipemizzante (statine, fibrati, omega3, ezetimibe, acido bempedoico, PCSK9i, siRNA)
	% Soggetti non trattati con ipolipemizzanti nonostante valori di C-LDL >=100 mg/dL
	% Soggetti con C-LDL>=100 mg/dL nonostante il trattamento con ipolipemizzanti
	% Soggetti trattati con antiipertensivi
	Distribuzione dei pazienti per classi di farmaco antiipertensivo (diuretici, ACE-Inibitori, sartani, calcioantagonisti, betabloccanti, alfabloccanti)
	% Soggetti non trattati con antiipertensivi nonostante valori di PA >=140/90 mmHg
	% Soggetti con PA >=130/80 mmHg nonostante il trattamento con antiipertensivi
	% Soggetti non trattati con ACE-inibitori e/o Sartani e nonostante la presenza di albuminuria (micro/macroalbuminuria)
	% Soggetti non trattati con SGLT2i e/o GLP-1RA e/o GLP1-RA+GIP nonostante la presenza di albuminuria
	% Soggetti non trattati con SGLT2i nonostante la presenza di eGFR<60 ml/min
	% Soggetti non trattati con GLP1-RA e/o SGLT2i e/o GLP1-RA+GIP nonostante pregresso evento CV

	% Soggetti non trattati con SGLT2i nonostante la presenza di scompenso cardiaco
	% Soggetti con evento cardiovascolare pregresso (infarto e/o ictus e/o rivascolarizzazione coronarica e/o periferica, bypass coronarico e/o periferico) in terapia antiaggregante piastrinica
	Indicatori di esito finale
	Distribuzione dei pazienti per grado di severità della retinopatia diabetica su totale monitorati per retinopatia (assente, non proliferante, proliferante, laser-trattata, cecità da diabete; maculopatia)
	% Soggetti con ulcera o gangrena o osteomielite del piede verificatasi nel periodo
p	% Soggetti con storia di amputazione minore
p	% Soggetti con storia di amputazione maggiore
p	% Soggetti in dialisi
p	% Soggetti con storia di infarto del miocardio
p	% Soggetti con storia di scompenso cardiaco
	Andamento per classi della FE (LVEF<=40%; LVEF 41-49%; LVEF >=50%)
p	% Soggetti con storia di ictus
	% Soggetti con storia di TIA
p	% Soggetti con storia di malattia cardiovascolare
	% Soggetti con almeno un episodio di ipoglicemia severa verificatosi nel periodo
	% Soggetti con almeno un episodio di ipoglicemia severa verificatosi nel periodo seguito da accesso al pronto soccorso o chiamata al 118 o ricovero ospedaliero
	Indicatori di qualità di cura complessiva
	Score Q medio nella popolazione assistita
	Soggetti con score Q <15
	Soggetti con score Q >25

Diabete gestazionale

	Indicatori descrittivi generali
	Diagnosi (GDM, diabete manifesto diagnosticato in gravidanza)
	Età media (anni)
	Età in classi (<35, 35-40, ≥ 40 anni)
	Settimana gestazionale media alla diagnosi
	Settimana gestazionale media al primo accesso della gravidanza in corso
	% Donne con familiarità di I grado per diabete di tipo 2
	% Donne con familiarità di I grado per diabete di tipo 1
	% Donne con prima gravidanza
	Numero medio di gravidanze precedenti
	% Donne con aborto precedente
	Numero medio di aborti precedenti
	% Donne con GDM pregresso
	% Donne con IFG pregresso
	% Donne con IGT pregresso
	% Donne con macrosomia pregressa
	BMI medio pre-gravidanza (Kg/m^2)
	BMI medio pre-gravidanza in classi (<18.5, 18.5-24,9, 25,0-29.9, 30.0-34.9, 35.0-39.9, >=40.0 Kg/m^2)
	Distribuzione per numero e tipo di comorbilità (Ipertensione, PCOS, disturbi della tiroide)
	% Donne con fecondazione assistita

	Indicatori di processo
	% Donne con 1 misurazione dell'HbA1c
	% Donne con almeno 2 misurazioni della pressione arteriosa durante la gravidanza
	% Donne con 1 valutazione della creatinina durante la gravidanza
	% Donne con almeno 1 valutazione dell'albuminuria durante la gravidanza
	% Donne con almeno 2 valutazioni del peso corporeo durante la gravidanza
	% Donne di pazienti con valori di OGTT disponibili
	Distribuzione delle prestazioni OGTT a <16 settimane, 16-18 settimane, 18.1 -23.9 settimane, 24-28 settimane, >28 settimane
	Settimana gestazionale media all'esecuzione dell'OGTT
	% Donne eleggibili* per OGTT a 16-18 settimane che eseguono OGTT a 16-18 settimane **presenza di fattori di rischio per GDM in base alle linee guida in vigore
	% Donne eleggibili** per OGTT a 24-28 settimane che eseguono OGTT a 24-28 settimane **tutte le donne non idonee per OGTT a 16-18 settimane
	Numero medio di visite per diabete dall'OGTT al parto
	% Donne che esibiscono l'OGTT post-parto (%)
	% Donne che esibiscono la valutazione del profilo lipidico post-parto (%)
	Indicatori di outcome intermedio
	Alla diagnosi:
	HbA1c media (%)
	HbA1c nelle classi: % con HbA1c 4-5,5% (20-37 mmol/mol), 5,6-6,4% (38-47 mmmol/mol), >= 6,5% (48 mmol/mol)
	% Donne con HbA1c <=5,5 % (37 mmmol/mol)
	Glicemia a digiuno media (mg/dL) (se non effettua OGTT)
	OGTT a 16-18 settimane: glicemia a T0' (mg/dL)

	OGTT a 16-18 settimane: glicemia a T60' (mg/dL)
	OGTT a 16-18 settimane: glicemia a T120' (mg/dL)
	OGTT a 24-28 settimane: glicemia a T0' (mg/dL)
	OGTT a 24-28 settimane: glicemia a T60' (mg/dL)
	OGTT a 24-28 settimane: glicemia a T120' (mg/dL)
	% Donne con glicemia basale >=126 mg/dL
	% Donne con glicemia all'OGTT >=200 mg/dL a T120'
	Durante la gravidanza:
	Glicemia a digiuno media (mg/dL)
	Pressione arteriosa sistolica media (mmHg)
	Pressione arteriosa diastolica media (mmHg)
	Alla fine della gravidanza (ultima visita prima del parto):
	Glicemia a digiuno media (mg/dL)
	Incremento di peso medio (Kg)
	Pressione arteriosa sistolica media (mmHg)
	Pressione arteriosa diastolica media (mmHg)
	Creatinina media (mg/dL)
	Albuminuria media (mg/dL)
	Indicatori di intensità/appropriatezza di trattamento
	Distribuzione per tipo di trattamento ipoglicemizzante (solo dieta, insulina, metformina)
	Settimana gestazionale di inizio insulina
	Distribuzione per tipo di regime insulinico (Solo insulina basale, solo insulina rapida, insulina basale+rapida)
	Dose media di insulina rapida (UI)
	Distribuzione per numero di iniezioni di insulina rapida (1,2,3)

	Dose media di insulina basale (UI)
	Trattamento antipertensivo (%)
	Acido folico (%)
	Inositolo (%)
	Trattamento con levotiroxina (%)
	Distribuzione per tipo di monitoraggio del glucosio (glucometro, FGM/CGM)
	Indicatori di esito finale
	Settimana gestazionale al parto (media e ds)
	Tipo di parto (spontaneo, indotto, taglio cesareo) (%)
	% parti gemellari
	% Outcome avversi della madre (mortalità, ipertensione indotta dalla gravidanza, preeclampsia, eclampsia, aborto spontaneo, aborto terapeutico, taglio cesareo)
	% Outcome neonatali (Nessuna complicanza, macrosomia >4000 g, grande per età gestazionale, piccolo per età gestazionale, distress respiratorio, distocia, ittero, ipocalcemia neonatale, ipoglicemia neonatale, policitemia, malformazione, necessità di terapia intensiva neonatale, morte neonatale)
	% Donne con sviluppo di disglicemia post-parto entro 12 settimane (IFG, IGT, IFG + IGT, DM2) (%)
	% Donne con OGTT normale 12 settimane dopo parto (NGT)
	Caratteristiche del bambino (distribuzione per genere, peso medio e lunghezza media, indice Apgar)
	% Donne con dislipidemia post-partum
	% Donne con allattamento al seno esclusivo

Lista delle abbreviazioni:

ACE – Enzima di conversione dell'angiotensina (Angiotensin-Converting Enzyme)
AMD – Associazione Medici Diabetologi
BMI – Indice di massa corporea (Body Mass Index)
CGM – Monitoraggio continuo del glucosio (Continuous Glucose Monitoring)
C-HDL – Colesterolo HDL (High-Density Lipoprotein Cholesterol)
C-LDL – Colesterolo LDL (Low-Density Lipoprotein Cholesterol)
CSII – Infusione sottocutanea continua di insulina (Continuous Subcutaneous Insulin Infusion)
CV – Coefficiente di variazione
DM1 – Diabete mellito di tipo 1
DM2 – Diabete mellito di tipo 2
DPP4i – Inibitori della dipeptidil-peptidasi 4 (Dipeptidyl Peptidase-4 Inhibitors)
FE – Frazione di eiezione
FGM – Monitoraggio flash del glucosio (Flash Glucose Monitoring)
FIB-4 – Indice FIB-4 per la fibrosi epatica (Fibrosis-4 Index)
gammaGT – Gamma-glutamiltransferasi
GDM – Diabete mellito gestazionale (Gestational Diabetes Mellitus)
GFR – Velocità di filtrazione glomerulare (Glomerular Filtration Rate)
GIP – Peptide insulinotropico glucosio-dipendente (Glucose-dependent Insulinotropic Polypeptide)
GLP1-RA – Agonisti del recettore del GLP-1 (Glucagon-Like Peptide-1 Receptor Agonists)
HbA1c – Emoglobina glicata
HSI – Indice di steatosi epatica (Hepatic Steatosis Index)
IDF – International Diabetes Federation
IFG – Glicemia a digiuno alterata (Impaired Fasting Glucose)
IGT – Tolleranza glucidica alterata (Impaired Glucose Tolerance)
IQR – Intervallo interquartile (Interquartile Range)
KDIGO – Kidney Disease: Improving Global Outcomes
LADA – Diabete autoimmune latente dell'adulto (Latent Autoimmune Diabetes in Adults)
LVEF – Frazione di eiezione del ventricolo sinistro (Left Ventricular Ejection Fraction)
MDI – Iniezioni multiple giornaliere di insulina (Multiple Daily Injections)
MODY – Diabete ad esordio giovanile dell'adulto (Maturity-Onset Diabetes of the Young)
NGT – Normale tolleranza al glucosio (Normal Glucose Tolerance)
OGTT – Test orale di tolleranza al glucosio (Oral Glucose Tolerance Test)
P – Dato permanente
PA – Pressione arteriosa
PAD – Pressione arteriosa diastolica
PAS – Pressione arteriosa sistolica
PCSK9i – Inibitori della proproteina convertasi subtilisina/kexina tipo 9
SAP – Microinfusore di insulina con sensore (Sensor-Augmented Pump)
SGLT2i – Inibitori del cotrasportatore sodio-glucosio di tipo 2 (Sodium-Glucose Cotransporter-2 Inhibitors)
siRNA – RNA interferente a piccolo filamento (Small Interfering RNA)
TAR – Tempo al di sopra dell'intervallo glicemico (Time Above Range)
TBR – Tempo al di sotto dell'intervallo glicemico (Time Below Range)
TIA – Attacco ischemico transitorio (Transient Ischemic Attack)
TIR – Tempo nell'intervallo glicemico (Time In Range)
UI – Unità internazionali