ARTERIOPATIA PERIFERICA NEI DIABETICI

Epidemiologia e costi con banche dati amministrative

Gruppo di lavoro

- Dott. R. Ciampichini, Centro Studi Sanità Pubblica, Università Milano-Bicocca
- Dott. R. De Giglio (Unità Piede Diabetico, ASST Ovest Milanese)
- Dott. R. Ferraresi (Emodinamica Periferica Interventistica, Humanitas Gavazzeni, Bergamo)
- Dott. E.M. Marone (Chirurgia Vascolare, IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia)

Arteriopatia Obliterante Periferica (PAD)

- ◆ Arteriopatia Periferica (PAD), insieme di disturbi caratterizzati da restringimento/occlusione delle arterie che irrorano gli arti inferiori

PAD: epidemiologia

- ◆ 200 mln di persone affette da PAD nel mondo (Hirsch, 2013)
- ◆ Associata ad alti tassi di amputazione, malattie cardiovascolari e decessi
- ◆ Assieme al fumo il diabete mellito (DM) è il più forte fattore di rischio per la PAD
 - ◆ Persone con DM hanno un rischio di sviluppare PAD di 1.5-4.0 volte maggiore rispetto ai non diabetici
 - ◆ Rischio di PAD aumenta con aumentare della durata del DM
 - ◆ In presenza di neuropatia periferica, PAD asintomatica

PAD: epidemiologia

- ◆ Prevalenza

 - ◆ 8-10.5% al momento della diagnosi di DM (Melton, 1980)

 - ◆ 17-33% dopo la diagnosi di DM (Beks 1995, Elhadd 1999)

- ◆ Mortalità di DM con PAD più alta rispetto alla sola presenza di DM o di PAD (Leibson, 2009)

PAD: costi

- ◆ L'associazione tra PAD ed eventi cardiovascolari e procedure di rivascolarizzazioni e/o amputazione comporta un utilizzo importante delle risorse sanitarie
- ◆ Gli studi in circolazione si focalizzano sulla gestione in acuto delle ulcere, amputazioni minori e maggiori:
 - ◆ $\approx 9/13$ mila € per ulcere (Prompers 2008, Stockl 2004)
 - ◆ $\approx 24,500$ per amputazione maggiore (Prompers 2008, Stockl 2004)

Obiettivi dello studio

Analisi della popolazione diabetica con PAD per valutare:

- Epidemiologia
- Costi sanitari diretti

su dati di popolazione attraverso banche dati amministrative

Data Warehouse DENALI (RL e Univ. Milano-Bicocca)

- Dati amministrativi Regione Lombardia
 - Esenzioni
 - Farmaceutica
 - Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO)
 - Specialistica ambulatoriale
 - Anagrafica: data di nascita, sesso, data decesso,...

Data Warehouse DENALI (RL e Univ. Milano-Bicocca)

- Dati amministrativi Regione Lombardia
 - Esenzioni
 - Farmaceutica
 - Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO)
 - Specialistica ambulatoriale
 - Anagrafica: data di nascita, sesso, data decesso,...

Data Warehouse DENALI (RL e Univ. Milano-Bicocca)

- Dati amministrativi Regione Lombardia
 - Esenzioni
 - Farmaceutica
 - Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO)
 - Specialistica ambulatoriale
 - Anagrafica: data di nascita, sesso, data decesso,...

Software DENALI

- ◆ Storia sanitaria degli assistiti RL attraverso record linkage probabilistico
- ◆ Accesso ai dati anonimizzati nel rispetto delle leggi sulla privacy

Selezione popolazione diabetica (DM)

Criteri 1: codice esenzione ticket per diabete OPPURE
due prescrizioni A10XXX entro 1 anno OPPURE
ricovero per 250.xx

Selezione popolazione diabetica (DM)

Prevalence of diabetes by Region, Italy 2014

Percentage of people that reported to have diabetes.

Criteri 1: codice esenzione ticket per diabete OPPURE
due prescrizioni A10XXX entro 1 anno OPPURE
ricovero per 250.xx

Selezione popolazione diabetica (DM)

RESEARCH ARTICLE

Burden of Diabetes Mellitus Estimated with a Longitudinal Population-Based Study Using Administrative Databases

Luciana Scalone^{1,2}, Giancarlo Cesana¹, Gianluca Furneri²,
Roberta Ciampichini^{1*}, Paolo Beck-Peccoz³, Virginio Chiodini¹, Silvia Mangioni¹,
Emanuela Orsi⁴, Carla Fornari¹, Lorenzo Giovanni Mantovani¹

1. CESP – Research Centre on Public Health, University of Milano Bicocca, Milan, Italy, 2. CHARTA Foundation, Milan, Italy, 3. Unit of Endocrinology and Diabetology, Department of Medical Sciences, Fondazione IRCCS Cà Granda - Ospedale Maggiore Policlinico, University of Milan, Milan, Italy, 4. Endocrinology and Diabetes Unit, Department of Medical Sciences, Fondazione IRCCS Cà Granda-Ospedale Maggiore Policlinico, San Giuseppe Hospital, Milan, Italy

Criteri 1: codice esenzione ticket per diabete OPPURE
due prescrizioni A10XXX entro 1 anno OPPURE
ricovero per 250.xx

Selezione popolazione diabetica (DM) con PAD

Criteri 2: RICOVERI (diagnosi prin e sec) e PROCEDURE (vasc/amp)

Tabella 1. Criteri di inclusione

CODICI DI DIAGNOSI NEI RICOVERI:	
64%	1. diabete con complicanze circolatorie periferiche (codice diagnosi ICD-9-CM 250.7x)
	2. aterosclerosi delle arterie native degli arti (codice diagnosi ICD-9-CM 440.20-440.24)
1%	3. angiopatia periferica in malattie classificate altrove (codice diagnosi ICD-9-CM 443.81)
11%	4. ulcera degli arti inferiori, eccetto ulcera da decubito (codice diagnosi ICD-9-CM 707.1)
	5. gangrena (codice diagnosi ICD-9-CM 785.4)
0%	6. amputazione di arto inferiore (codice diagnosi ICD-9-CM v49.7)
CODICI DI PROCEDURE DI VASCULARIZZAZIONE/AMPUTAZIONE NEI RICOVERI:	
	7. amputazione di dita del piede (codice procedura ICD-9-CM 84.11)
	8. amputazione al livello del piede (codice procedura ICD-9-CM 84.12)
	9. disarticolazione della caviglia (codice procedura ICD-9-CM 84.13)
	10. amputazione della caviglia a livello dei malleoli della tibia e fibula (codice procedura ICD-9-CM 84.14)
10%	11. altra amputazione al di sotto del ginocchio (codice diagnosi ICD-9-CM 84.15)
	12. amputazione al di sopra del ginocchio (codice diagnosi ICD-9-CM 84.17)
	13. bypass aorto-iliaco-femorale (codice procedura ICD-9-CM 39.25)
	14. altri anastomosi o bypass vascolari periferici (codice procedura ICD-9-CM 39.29)
	15. angioplastica o aterectomia di altri vasi non coronarici (codice procedura ICD-9-CM 39.50)
	16. inserzione di stent non medicato in vaso periferico (codice procedura ICD-9-CM 39.90)
	17. inserzione di stent medicati in vasi periferici (codice procedura ICD-9-CM 00.55)

13% compresenza di codici
di cui il 98% contenenti 1 e 2

RISULTATI

Popolazione DM con PAd

Descrizione della popolazione in studio alla data indice

Soggetti con DM e PAD nel periodo 2002-2009

Variables	Revasc Group*	NoRevasc Group	Total
N (% on total)			18,344 (100)
Males (%)			61
Age at index date in years			
Females: mean (SD)			75 (9.8)
min-max			40-101
Males: mean (SD)			70 (9.6)
min-max			40-98
F&M: mean (SD)			72 (10.1)
min-max			40-101

*Revasc: almeno un ricovero con procedura di rivascolarizzazione tra:
 39.25 (bypass), 39.29 (bypass), 39.50 (angioplastica), 39.90 (stent non med), 00.55 (stent med)

Descrizione della popolazione in studio alla data indice

Soggetti con DM e PAD nel periodo 2002-2009

Variables	Revasc Group*	NoRevasc Group	Total
N (% on total)	6,674 (36)	11,670 (64)	18,344 (100)
Males (%)	70	56	61
Age at index date in years			
Females: mean (SD)	73 (9.2)	76 (10.0)	75 (9.8)
min-max	40-99	40-101	40-101
Males: mean (SD)	69 (8.7)	70 (10.1)	70 (9.6)
min-max	40-96	40-98	40-98
F&M: mean (SD)	70 (9.1)	73 (10.5)	72 (10.1)
min-max	40-99	40-101	40-101

*Revasc: almeno un ricovero con procedura di rivascolarizzazione tra:
 39.25 (bypass), 39.29 (bypass), 39.50 (angioplastica), 39.90 (stent non med), 00.55 (stent med)

Descrizione della popolazione in studio alla data indice

Soggetti con DM e PAD nel periodo 2002-2009

Variables	Revasc Group	NoRevasc Group	Total
N (% on total)	6,674 (36)	11,670 (64)	18,344 (100)
Males (%)	70	56	61
Indice di comorbidità			
CCI score			
median (min-max)	1 (0-14)	2 (0-14)	2 (0-14)
%of pts with CCI>=3	31	34	33

*Revasc: almeno un ricovero con procedura di rivascolarizzazione tra:
39.25 (bypass), 39.29 (bypass), 39.50 (angioplastica), 39.90 (stent non med), 00.55 (stent med)

Descrizione della popolazione in studio alla data indice

Soggetti con DM e PAD nel periodo 2002-2009

Principali comorbidità

Sopravvivenza osservata (DM e PAD 2002-2009)

Sopravvivenza osservata (DM e PAD 2002-2009)

Sopravvivenza osservata (DM e PAD 2002-2009)

DENALI DM-2003: 4,3 decessi x 100 person-years (Scalone 2013)

Sopravvivenza osservata (DM e PAD 2002-2009)

Fattori per cui controllare la mortalità:

- Età
- Sesso
- Indice di comorbidità
- Anno indice

Sopravvivenza aggiustata per: età, sesso, cci, amputazione

Sopravvivenza aggiustata per: età, sesso, cci, amputazione

Costi sanitari diretti per anno di osservazione

DM e PAD 2002-2009

Costo medio per paziente: DM-PAD 2002-2009

Costo medio per paziente: DM-PAD 2002-2009

Costo medio per paziente: DM-PAD 2002-2009

Modello di regressione dei costi: DM-PAD 2002-2009

Osservazioni finali

DWH-DENALI e dati amministrativi

- Fotografia di carico di malattia attualmente assente in letteratura per diabete con PAD: circa 70mila anni-persona
- Prevalenza, comorbidità, sopravvivenza ed utilizzo delle risorse sanitarie dirette
- Limite: dati amministrativi, precisi sulle risorse e legati alle codifiche (spesso limitanti) per la parte clinica
- Utile confronto dei dati descritti con il periodo 2010-2015: centri specializzati e multidisciplinari

ARTERIOPATIA PERIFERICA NEI DIABETICI

Epidemiologia e costi con banche dati amministrative

Gruppo di lavoro

- Dott. R. Ciampichini, Centro Studi Sanità Pubblica, Università Milano-Bicocca
- Dott. R. De Giglio (Unità Piede Diabetico, ASST Ovest Milanese)
- Dott. R. Ferraresi (Emodinamica Periferica Interventistica, Humanitas Gavazzeni, Bergamo)
- Dott. E.M. Marone (Chirurgia Vascolare, IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia)