**XV CONGRESSO
REGIONALE
AMD MOLISE**

**22 OTTOBRE 2022
HOTEL CENTRUM PALACE
CAMPOBASSO**

Diabete e vaccinazioni

Angelo Salzo

Dirigente Medico I Livello – A.S.Re.M.

Cattedra di Igiene - Unimol

Un grave problema di salute pubblica nel mondo

WHO. Diabetes key facts:
<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diabetes>

Key facts

- The number of people with diabetes rose from 108 million in 1980 to 422 million in 2014. Prevalence has been rising more rapidly in low- and middle-income countries than in high-income countries.
- Diabetes is a major cause of blindness, kidney failure, heart attacks, stroke and lower limb amputation.
- Between 2000 and 2019, there was a 3% increase in diabetes mortality rates by age.
- In 2019, diabetes and kidney disease due to diabetes caused an estimated 2 million deaths.
- A healthy diet, regular physical activity, maintaining a normal body weight and avoiding tobacco use are ways to prevent or delay the onset of type 2 diabetes.
- Diabetes can be treated and its consequences avoided or delayed with diet, physical activity, medication and regular screening and treatment for complications.

Today
415 MILLION
 people worldwide are living with diabetes.

In 2040
MORE THAN HALF A BILLION
 will have diabetes.

Global

Diabetes data report 2000 — 2045

Diabetes estimates (20-79 y)					
	2000	2011	2021	2030	2045
People with diabetes, in 1,000s	151,000.0	366,000.0	536,600.0	642,800.0	783,700.0
Age-adjusted comparative prevalence of diabetes, %	4.6	8.5	9.8	10.8	11.2
People with undiagnosed diabetes, in 1,000s	-	183,000.0	-	-	-
Proportion of people with undiagnosed diabetes, %	-	50.0	44.7	-	-

Italy

Diabetes report 2000 — 2045

Diabetes estimates (20-79 y)					
	2000	2011	2021	2030	2045
People with diabetes, in 1,000s	3,125.4	3,560.4	4,470.3	4,699.1	4,595.4
Age-adjusted comparative prevalence of diabetes, %	-	5.1	6.4	7.4	8.0
People with undiagnosed diabetes, in 1,000s	-	-	1,497.7	-	-

ISS Epicentro -

<https://www.epicentro.iss.it/diabete/epidemiologia-italia>

Una malattia ad alto impatto

Head and neck infections

- Malignant otitis externa
- Periodontal disease
- Mucormycosis
- Bacterial meningitis
- Endophthalmitis
- Invasive fungal sinusitis

Respiratory tract infections and tuberculosis

- Tuberculosis, particularly pulmonary tuberculosis
- Upper respiratory tract infection
- Lower respiratory tract infection—eg, community-acquired pneumonia
- Melioidosis

Urinary tract infections

- Cystitis
- Pyelonephritis
- Asymptomatic bacteriuria

Intra-abdominal infections

- Cholecystitis and subsequent gallbladder perforation
- Infection related to gangrenous appendicitis
- Peritonitis

Skin and cutaneous tissues

- Folliculitis
- Fournier's gangrene
- Cellulitis
- Infected diabetic foot
- Candidal infections
- Bone and joint infections
- Necrotising fasciitis
- Surgical site infections
- Dialysis line associated infections

Signal infections

- Osteomyelitis
- Necrotising fasciitis
- Meningitis
- Cellulitis

Risposta immunitaria compromessa per l'iperglicemia

Casqueiro J, et al. Infections in patients with diabetes mellitus: A review of pathogenesis. Indian J Endocrinol Metab. 2012 Mar;16 Suppl 1(Suppl1):S27-36.

Le vaccinazioni raccomandate nel pz. diabetico

Vaccinazione anti difterite-tetano-pertosse (dTpa)

YEARS:

1 dose di vaccino anti-dTpa ogni 10 anni

Vaccinazione anti pneumococco

PCV13 8 settimane **PPSV23** 5 anni **PPSV23** ≥ 65 anni

CDC. Pneumococcal Vaccine Timing for Adults

Vaccinazione anti pneumococco

Administer one dose of PCV15 or PCV20.

If **PCV20** is used, their pneumococcal vaccinations are complete.

PCV20

If **PCV15** is used, follow with one dose of PPSV23.

- The recommended interval is at least 1 year.
- The minimum interval is 8 weeks and can be considered in adults with an immunocompromising condition*, cochlear implant, or cerebrospinal fluid leak.
- Their pneumococcal vaccinations are complete.

Vaccinazione anti herpes zoster

Diabetes mellitus

Vaccinazione anti-zoster

PNPV 2017-2019

L'Herpes Zoster è una malattia debilitante causata dalla riattivazione del VZV silente nei gangli del sistema nervoso.

La presenza di alcune patologie può aumentare il rischio di patologia da herpes zoster o aggravarne il quadro sintomatologico. Oltre alla fascia d'età anziana la vaccinazione va quindi offerta in presenza di:

- Diabete mellito
- Patologia cardiovascolare
- BPCO
- Soggetti destinati a terapia immunosoppressiva

Vaccinazione anti herpes zoster

DIPARTIMENTO UNICO DI PREVENZIONE DIRETTORE DOTT.SSA CARMEN MONTANARO PIAZZA DELLA VITTORIA N.14/A – CAMPOBASSO	Rev. 0
	ISTRUZIONE OPERATIVA VACCINAZIONE CONTRO HERPES ZOSTER	10/05/2022

VACCINAZIONE DELLA COORTE DEI 65ENNI E DEI SOGGETTI CON ETÀ UGUALE O SUPERIORE A 50 ANNI

L'offerta gratuita del vaccino ZOSTAVAX, così come previsto dal PNPV 2017-2019 e dal PRPV 2017-2019 tuttora vigenti, è riservata ai soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

- coorte d'età dei 65enni con chiamata attiva,
- recupero dei soggetti che hanno compiuto 65 anni a partire dal 2017 (nati dal 1952),
- soggetti con età uguale o superiore a 50 anni con diabete mellito, patologie cardiovascolari e polmonari non rientranti al punto b) dell'elenco sopra indicato.

VACCINO RICOMBINANTE ADIUVATO: INDICAZIONI D'USO E OFFERTA GRATUITA SU RICHIESTA

Ad oggi, come previsto dal recente Piano Regionale della Prevenzione, l'offerta del vaccino SHINGRIX è gratuita, su richiesta del Medico di Medicina generale o dello specialista, esclusivamente per i soggetti appartenenti alle seguenti categorie indicate in tabella:

a) Soggetti di età 18-49 anni

- **cardiopatie croniche** (*esclusa l'ipertensione isolata*)
- **diabete mellito**
- **malattie polmonari croniche**
- **candidati a terapia immunosoppressiva**
- **malattie reumatologiche in attesa o in corso di terapia immunosoppressiva**
- **patologie oncologiche e oncoematologiche**
- **trattamento dialitico**
- **positività al virus dell'immunodeficienza umana acquisita (HIV)**
- **attesa di trapianto di organo solido**
- **trapiantati di organo solido**
- **trapiantati con cellule staminali emopoietiche**

b) Soggetti di età pari o superiore a 50 anni altamente fragili e con rischio aumentato di HZ o di complicanze ad esso associate

- **diabete mellito** *trattato con terapia insulinica o con almeno due farmaci ipoglicemizzanti o diabete con complicanze*
- **cardiopatie croniche** *con scompenso cardiaco in classe avanzata – NYHA III- IV, post shock cardiogeno, portatori di dispositivi medici cardiaci impiantati attivi*
- **broncopneumopatie croniche ostruttive**, asma, fibrosi polmonare idiopatica, soggetti in ossigenoterapia
- **candidati a terapia immunosoppressiva**
- **malattie reumatologiche in attesa o in corso di terapia immunosoppressiva**
- **patologie oncologiche e oncoematologiche**
- **trattamento dialitico**
- **positività al virus dell'immunodeficienza umana acquisita (HIV)**
- **attesa di trapianto di organo solido**
- **trapiantati di organo solido**
- **trapiantati con cellule staminali emopoietiche**

Vaccinazione antinfluenzale

Ricadute economiche

-1,6% P.I.L. in EU

Pressioni sui servizi pubblici e sanitari

Assenza da scuola

Paloma Carrillo-Santistevé et al. (2012) The importance of influenza prevention for public health, Human Vaccines & Immunotherapeutics

L'impatto dell'influenza non interessa solo la salute...

Dosaggio, modalità di somministrazione e scelta

Età	Vaccini-somministrabili	Dosi e modalità di somministrazione
6 mesi-9 anni	- sub-unità, split quadrivalente (QIV)	- 2 dosi (0,50 ml) ripetute a distanza di almeno 4 settimane per bambini che vengono vaccinati per la prima volta - 1 dose (0,50 ml) se già vaccinati negli anni precedenti
2 anni-9 anni	- Vaccino quadrivalente su colture cellulari (VIQcc) - Vaccino vivo attenuato (LAIV)	- 2 dosi (0,50 ml) ripetute a distanza di almeno 4 settimane per bambini che vengono vaccinati per la prima volta - 1 dose (0,50 ml) se già vaccinati negli anni precedenti - 2 dosi (0,2 ml) ripetute a distanza di almeno 4 settimane per bambini che vengono vaccinati per la prima volta - 1 dose (0,2 ml) se già vaccinati negli anni precedenti
10-17 anni	- sub-unità, split quadrivalente (QIV) - quadrivalente su colture cellulari (VIQcc) - Vaccino vivo attenuato (LAIV)	- 1 dose (0,50 ml) - 1 dose (0,50 ml) - 1 dose (0,2 ml)

Dosaggio

Una sola dose; per i bambini sotto i 9 anni di età, mai vaccinati in precedenza, due dosi, a distanza di almeno 4 settimane

Modalità di somministrazione

M. vasto laterale < 2 anni
M. deltoidee ≥ 2 anni

LAIV

Metà della dose in una narice; l'altra metà nell'altra narice. Respirare normalmente.

VIQcc

Caratteristiche simili al VQ coltivato su uova embrionate di pollo. Per soggetti con condizioni di rischio da 2 anni di età e ≥ 65

Vaccinare il diabetico annualmente nel periodo compreso tra ottobre e dicembre

Dosaggio, modalità di somministrazione e scelta

18-64 anni	<ul style="list-style-type: none">- sub-unità, split quadrivalente (QIV)- quadrivalente su colture cellulari (VIQcc)- quadrivalente a DNA ricombinante (VIQr)- quadrivalente ad alto dosaggio (VIQhd)	- 1 dose (0,50 ml)
≥ 65 anni	<ul style="list-style-type: none">- sub-unità, split quadrivalente (QIV)- quadrivalente su colture cellulari (VIQCC)- quadrivalente ad alto dosaggio (HD)- quadrivalente (VIQa) adiuvato con MF59- quadrivalente a DNA ricombinante (VIQr)	<ul style="list-style-type: none">- 1 dose (0,50 ml)- 1 dose (0,50 ml)- 1 dose (0,70 ml)- 1 dose (0,50 ml)- 1 dose (0,50 ml)

01

VIQa e VIQhd

Specificamente indicati negli ultra 65enni (dopo i 60 anni anche VIQhd)

02

Dosaggio

Una sola dose per i soggetti di tutte le età, IM, m. deltoide

03

VIQcc

Caratteristiche simili al VQ coltivato su uova embrionate di pollo. Per soggetti con condizioni di rischio da 2 anni di età e over 65

Vaccinare il diabetico annualmente nel periodo compreso tra ottobre e dicembre

Somministrazione simultanea di più vaccini

YEARS:

PCV13 8 settimane **PPSV23** 5 anni **PPSV23** ≥ 65 anni

CDC. Pneumococcal Vaccine Timing for Adults

Cunningham AL, et al. Vaccines for older adults. *BMJ*. 2021 Feb 22;372:n188

Vaccinazione anti SARS-CoV-2

È raccomandato che il paziente diabetico riceva tutte le dosi di vaccino anti-SARS-CoV-2, compreso il secondo booster se ha almeno 12 anni...

0043189-17/10/2022-DGPRE-DGPRE-P

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
Ufficio 5 - Prevenzione malattie trasmissibili e profilassi internazionale

Aree di patologia/condizione	Definizione della condizione
Diabete / altre endocrinopatie severe	<ul style="list-style-type: none">- Diabete di tipo 1;- Diabete di tipo 2 in terapia con almeno 2 farmaci per il diabete o con complicanze;- Morbo di Addison;- Panipopituitarismo.

...e il terzo booster se ha un'età uguale o superiore a 60 anni

Somministrazione simultanea di più vaccini

0043189-17/10/2022-DGPRE-DGPRE-P

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
Ufficio 5 - Prevenzione malattie trasmissibili e profilassi internazionale

Si specifica, infine, che, per tutti i vaccini anti-SARS-CoV-2/COVID-19 autorizzati in Italia, è possibile la somministrazione concomitante (o a qualsiasi distanza di tempo, prima o dopo) con altri vaccini, compresi i vaccini basati sull'impiego di patogeni vivi attenuati, con l'eccezione del vaccino contro il vaiolo delle scimmie (MVA-BN), per il quale resta ancora valida l'indicazione di una distanza di almeno 4 settimane (28 giorni) tra un vaccino e l'altro. Si sottolinea l'importanza di considerare la possibilità di co-somministrare il vaccino antinfluenzale e quello anti-SARS-CoV-2 nella preparazione e conduzione della campagna di vaccinazione contro il virus dell'influenza.

Altre vaccinazioni raccomandate

Diabete e meningite batterica

- anti-meningococco B
- anti-meningococco tetravalente ACYW₁₃₅

Diabete ed epatite B

- Ciclo primario per tutti i diabetici in passato non immunizzati.
- Booster se HbsAb neg.

Take home message

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

Grazie per l'attenzione

Azienda Sanitaria
Regionale del Molise

dipartimentounicoprevenzione@asrem.org

angelo.salzo@asrem.org