

CLUB di AMD

Regione Emilia Romagna

NEWS DALLA LETTERATURA






















01/03/2022

Nota 100, associabilità e RCP






















Dr.ssa Lo Preiato

Nuove tecnologie e gravidanza













Dr.ssa Mazzotti

	Metformina	Glitazoni	Sulfaninuree	SGLT2i	Insulina basale	Insulina rapida
Liraglutide (Victoza®) 	Victoza è indicato per il trattamento di adulti affetti da diabete mellito tipo 2 [...] in combinazione con farmaci ipoglicemizzanti orali e/o insulina basale. [...]					
	 (LEAD-2, LEAD-4, LEAD-5, LEAD-6)	 (LEAD-4)	 (LEAD-1, LEAD 5, LEAD-6)		 <i>Degludec, Detemir</i>	
Exenatide (Byetta®) 	Byetta è indicato nel trattamento del diabete mellito di tipo 2 in associazione a metformina, sulfoniluree, tiazolidinedioni. [...] Byetta è inoltre indicato anche come terapia aggiuntiva a insulina basale con o senza metformina e/o pioglitazone in adulti che non hanno raggiunto un adeguato controllo glicemico con questi medicinali.					
					 <i>Glargine</i>	
Lixisenatide (Lyxumia®) 	Lyxumia è indicato per il trattamento di adulti con diabete mellito di tipo 2 per ottenere il controllo glicemico in associazione con antidiabetici orali e/o insulina basale.					
	 (GetGoal-M)	 (GetGoal-P)	 (GetGoal-S)		 <i>Glargine, Detemir, NPH</i> (GetGoal-L GetGoalDuo1)	








GLP1ra (2)



	Metformina	Glitazoni	Sulfaninuree	SGLT2i	Insulina basale	Insulina rapida
<p>Exenatide LAR (Bydureon®)</p> 	<p>Bydureon è indicato in pazienti adulti [...] con diabete mellito di tipo 2 per migliorare il controllo glicemico in associazione con altri farmaci ipoglicemizzanti inclusa insulina basale. [...]</p>					
	 (DURATION-7)			 <i>Dapagliflozin</i> (DURATION-8)	 <i>Glargine</i> (DURATION-7)	
<p>Dulaglutide (Trulicity®)</p> 	<p>Trulicity è indicato per il trattamento di adulti affetti da diabete mellito di tipo 2 [...] in aggiunta di altri medicinali per il trattamento del diabete.</p>					
	 (AWARD 1, 2, 5, 6, 10)	 (AWARD 1)	 (AWARD 2, 8)	 (AWARD 10)	 <i>Glargine</i> (AWARD 9)	 <i>Lispro</i> (AWARD 4)
<p>Semaglutide (Ozempic®)</p> 	<p>Ozempic è indicato per il trattamento di adulti affetti da diabete mellito di tipo 2 [...] in aggiunta ad altri medicinali per il trattamento del diabete.</p>					
	 (SUSTAIN 2, 3, 4, 7, 9)	 (SUSTAIN 2)	 (SUSTAIN 3, 4, 9)	 (SUSTAIN 9)	 <i>Glargine, Degludec</i> <i>Detemir, NPH</i> (SUSTAIN 5)	

Associazioni GLP1ra/insulina










	Metformina	Glitazoni	Sulfaninuree	SGLT2i	Insulina rapida
Liraglutide + degludec (Xultophy) 	Xultophy è indicato per il trattamento di adulti affetti da diabete mellito di tipo 2 non adeguatamente controllato [...] in associazione con altri antidiabetici orali.				
	 (DUAL I, II, III, IV, V, VI, VII, IX)	 (DUAL I, III, IV, VI, VII, IX)	 (DUAL IV, IX)	 (DUAL IX)	
	Metformina	Glitazoni	Sulfaninuree	SGLT2i	Insulina rapida
Lixisenatide + glargine (Suliqua) 	Suliqua è indicato per il trattamento di adulti affetti da diabete mellito di tipo 2 non adeguatamente controllato [...] in associazione con metformina con o senza SGLT2i.				
	 (LixiLan-O, LixiLan-L, LixiLan-G)	 (LixiLan-G)		 (LixiLan-G)	

GLP1ra orale



	Metformina	Glitazoni	Sulfaninuree	SGLT2i	Insulina basale	Insulina rapida
Semaglutide orale (Rybelsus®) 	Rybelsus è indicato per il trattamento di adulti affetti da diabete mellito di tipo 2 [...] in associazione con altri medicinali per il trattamento del diabete.					
	 (PIONEER 2, 4, 5, 7, 8)	 (PIONEER 7)	 (PIONEER 5, 7)	 (PIONEER 4, 7)	 (PIONEER 5)	 (PIONEER 8)

	Metformina	Glitazoni	Sulfaninuree	DPP4i	Insulina basale	Insulina rapida
<p>Dapagliflozin (Forxiga®)</p> 	<p>Forxiga è indicato in pazienti adulti e bambini dai 10 anni di età in su, non adeguatamente controllati per il trattamento del diabete mellito di tipo 2 [...] in aggiunta ad altri medicinali per il trattamento del diabete di tipo 2.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forxiga è indicato negli adulti per il trattamento dell'insufficienza cardiaca cronica sintomatica con frazione di eiezione ridotta. - Forxiga è indicato negli adulti per il trattamento della malattia renale cronica. 					
	✓	✓	✓	✓ <i>Sitagliptin</i> <i>Saxagliptin</i>	✓	?
<p>Empagliflozin (Jardiance®)</p> 	<p>Jardiance è indicato [...] nel trattamento degli adulti con diabete mellito di tipo 2 non adeguatamente controllato [...] in aggiunta ad altri medicinali per il trattamento del diabete.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jardiance è indicato negli adulti per il trattamento dell'insufficienza cardiaca cronica sintomatica con frazione di eiezione ridotta. 					
	✓	✓	✓	✓ <i>Linagliptin</i>	✓	✓

SGLT2i (2)

	Metformina	Glitazoni	Sulfaninuree	DPP4i	Insulina basale	Insulina rapida
<p>Canagliflozin (Invokana®)</p> 	<p>Invokana è indicato per il trattamento di pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2 non sufficientemente controllato [...] in associazione con altri medicinali per il trattamento del diabete.</p>					
	✓	✓	✓	 Sitagliptin	✓	✓
<p>Ertugliflozin (Steglatro®)</p> 	<p>Steglatro è indicato in pazienti adulti di età pari o superiore a 18 anni con diabete mellito di tipo 2 [...] in aggiunta ad altri medicinali usati per il trattamento del diabete.</p>					
	 (VERTIS-MET)		 (VERTIS-SU)	 Sitagliptin (VERTIS-FACTORIAL)		

Associazioni SGLT2i/DPP4i

	Metformina	Glitazoni	Sulfaninuree	DPP4i	Insulina basale	Insulina rapida
<p>Dapagliflozin/ Saxagliptin (Qtern®)</p> 	<p>Qtern, associazione fissa di saxagliptin e dapagliflozin, è indicato in pazienti adulti a partire dai 18 anni di età con diabete mellito di tipo 2 per migliorare il controllo glicemico quando metformina e/o sulfonilurea e uno dei principi attivi di Qtern non forniscono un adeguato controllo glicemico o in caso di pazienti già in trattamento con la combinazione libera di dapagliflozin e saxagliptin.</p>					
<p>Empagliflozin/ Linagliptin (Glyxambi®)</p> 	<p>Glyxambi, associazione a dose fissa di empagliflozin e linagliptin, è indicato negli adulti di età pari o superiore a 18 anni affetti da diabete mellito di tipo 2 per migliorare il controllo della glicemia quando metformina e/o sulfanilurea e uno dei monocomponenti di Glyxambi non forniscono un adeguato controllo della glicemia o in caso di terapia già in corso con empagliflozin e linagliptin in associazione libera.</p>					

	Metformina	Glitazoni	Sulfaninuree	Insulina
Sitagliptin (Januvia®)	Per pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2, Januvia è indicato [...] in associazione con: metformina, [...] sulfonilurea, [...] un agonista del recettore gamma attivato dal proliferatore del perossisoma (PPAR γ) [...]. Januvia è anche indicato come terapia aggiuntiva all'insulina (con o senza metformina) [...].			
Linagliptin (Trajenta®)	Trajenta in aggiunta alla dieta e all'esercizio fisico è indicato [...] in associazione con altri medicinali per il trattamento del diabete, compresa l'insulina, [...]			
Alogliptin (Vipidia®)	Vipidia è indicato negli adulti di età pari o superiore a 18 anni affetti da diabete mellito di tipo 2 per migliorare il controllo glicemico in combinazione con altri medicinali ipoglicemizzanti inclusa insulina [...]			
Saxagliptin (Onglyza®)	Onglyza è indicato in pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2 [...] in associazione con altri medicinali per il trattamento del diabete, inclusa l'insulina [...]			
Vildagliptin (Galvus®)	Vildagliptin è indicato, in aggiunta alla dieta e all'esercizio fisico, per migliorare il controllo glicemico nei pazienti adulti con diabete mellito di tipo [...] in associazione con altri medicinali per il trattamento del diabete, compresa l'insulina [...]			
Alogliptin/ Pioglitazone (Incresync®)	Incresync è indicato [...] in combinazione a metformina (cioè terapia di combinazione triplice) come aggiunta alla dieta e all'esercizio fisico per migliorare il controllo glicemico [...]			

AMD

ASSOCIAZIONE
MEDICI
DIABETOLOGI

1974

ANNO DI FONDAZIONE

Con la collaborazione del
Gruppo Giovani

AMD

Grazie!