

IRC	Stadio II		Stadio III-A		Stadio III - B	Stadio IV		Stadio V		
	Lieve		Moderata			Severa (Grave)		Terminale		
GFR	90-80	80-60	60-50	50-45	45-30	30-20	20-15	<15	dialisi	
Metformina	2550 (3000)		2000		1000					
Acarboso										
Pioglitazone										
DPP4i										
Sitagliptin <i>Januvia</i>	100				50	25				
Vildagliptin <i>Galvus</i>	50 x 2				50			Mancano dati		
Linagliptin <i>Trajenta</i>	5									
Alogliptin <i>Vipidia</i>	25		12,5		6,25					
Saxagliptin <i>Onglyza</i>	5				2,5					
GLP1-AR										
Dulaglutide <i>Trulicity</i>	Iniziare 0,75 per 4 settimane -->1,5									
Exenatide LAR <i>Bydureon</i>	2									
Semaglutide s.c. <i>Ozempic</i>	Iniz. 0,25 (non terapeutica) per 4 settimane ==> 0,5 --> 1					Mancano dati				
Semaglutide orale <i>Rybelsus</i>	Iniz. 3 (non terapeutica) per 28 giorni ==> 7 --> 14					Scarsa esperienza				
Liraglutide <i>Victoza</i>	Iniziare 0,6 per 7 giorni --> 1,2 --> 1,8					Mancano dati				
Lixisenatide <i>Lyxumia</i>	Iniziare 10 per 14 giorni --> 20									
SGLT2i (manca controllo glicemico se < GFR 45 ml/min)										
Empaglifozin <i>Jardiance</i>	Iniziare 10 --> 25		Iniziare 10 --> 10		? --> 10					
			Iniziare 10 se malattia CV --> 10							
	Iniziare 10 se Scopenso Cardiaco --> 10									
Dapaglifozin <i>Forxiga</i>	Iniziare 10 --> 10					Non iniziare --> 10				
Canaglifozin <i>Invokana</i>	Iniziare 100 --> 300		Non iniziare ? --> 100			100 se albuminuria > 300 mg/die				
Ertuglifozin <i>Steglatro</i>	Iniziare 5 --> 15				n.i.--> 5					
Sulfaniluree										
Repaglinide										
GFR	90-80	80-60	60-50	50-45	45-30	30-20	20-15	<15	dialisi	

By Eliana 20.2.2022 (dati raccolti da RCP AIFA)