









Un'ora con AMD-SID-SIE-SIEDP


Supporto tecnologico

METEDA



Ma cosa intendiamo per «matrimonio » felice?





Non ruotare i siti di iniezione dell'insulina

Atrofica Ipertrofica

- -Non iniettare l'insulina in profondità (derma o muscolo)
 - Cambia l'ago ad ogni iniezione
- Ruota i siti di iniezione e distanzia di almeno 1 cm le iniezioni
 - Utilizza ago corto meglio se da 4 mm



Non ruotare i siti di iniezione (MICRONFUSORI)

05:09 00:25




Non rispettare i «tempi» dell'insulina

duration (hours)



types of insulin starts to work 5-10 minutes peaks 30-90 minutes rapid-acting starts to work regular-/short-acting 30 mins - 1 hour peaks intermediate-acting intensity 2-5 hours starts to work 1-2 hours long-acting peaks 4-12 hours starts to work 1-2 hours does not peak 14 10 18







Rispettiamo l'insulina ... e i "suoi tempi"

Insulina ad azione ultrarapida (Novorapid, Humalog, Apidra)

Insulina ad azione rapida (Humulin R, Insuman R)

15 minuti di attesa prima di iniziare il pasto

Tempo di insulina attiva (IOB)
2-3 h

30 minuti di attesa prima di iniziare il pasto

Tempo di insulina attiva (IOB)

<u>5-6 h</u>

Bisogna attendere sempre, prima di mangiare, anche con la glicemia al limite basso (80-90 etc etc)?

0.2

00:00

02:00

04:00 06:00

08:00

10:00


12:00


00:00 02:00 04:00 06:00


08:00


10:00 12:00 14:


Praticare boli o dosi di insulina ravvicinate












Evitare boli ravvicinati sia per i pasti che per le correzioni delle iperglicemie



BOLI ogni 2 ore



Pesare i cibi «a occhio»

PANINO (





PES0		CHO		
80g		38,2g		
n. pz	1	Proteine 7,6g		
Kcal	218,4	Lipidi 3,3g		



PANINII AI I ULIU

Pesare i cibi «a occhio»

PORZIONE 2

80g pasta + 174g ingredienti condimento

CRUDO		CH0	
80g pasta		67,8g	
Cotto	280g	Protein	e 25g
Kcal	467	Lipidi	12,5g





40g pasta		47	1.0	
80g fagioli		67,4g		
Cotto	335g	Protein	e 20,1g	
Kcal	441,6	Lipidi	11,9g	



PORZIONE 2


80g pasta + 147g ingredienti condimento


CRUDO	CHO		
80g pasta	67,2g		
Cotto 280g	Proteine 26,2g		
Kcal 441	Lipidi 9,4g		


45g pasta		52g		
Cotto	315g	Proteine 30,9g		
Kcal	522	Lipidi 22,6g		




Pesare i cibi «a occhio»








Non usare il calcolatore di bolo



MANGIARE SENZA INSULINA














Un'ora con AMD-SID-SIE-SIEDP

Supporto tecnologico

METEDA

Non correggere l'ipoglicemia col giusto metodo

Indice glicemico per alimenti



Datteri 120 Form., uova, carni 10
Glucosio 100 Burro e oli 5
Pane 75
Zucchero 70
Risotto 65
Frutta 50
Pasta 40
Fruttosio 23

Glucosio !!!!!!!




- Biscotti
- Pane
- Pasta
- Cioccolato
- Frutta (non dolcificata)
- Dolci

Correzione ipoglicemia con GLUCOSIO






Correzione ipoglicemia «MANGIO PRIMA E DOPO PRATICO L'INSULINA»



Interpretazione dei dati di trend

Valutazione dell'andamento a 30'

SENSORE FGM			2	71	1	
SENSORE SENZA PREDITTIVO G5/G6	44	Ψ.	2	21	^	22
SENSORE CON PREDITTIVO	444	11	4	1	企	ተተተ
TREND	- 100	- 75	- 50	+ 50	+ 75	+ 100





Attenzione! Un bambino che pesa 20 kg può correggere un'ipoglicemia con un minimo di 2 gr di glucosio (0,1 gr/kg) e con un massimo di 6 gr di glucosio (0,3 gr/kg).

Mio figlio/a pesacorregge con un minimo di e con un massimo di........


	Succo di fru	80 mL cola	Zucchero da cucina
5 gr di glucosio			1 cucchiaino raso o una bustina
10 gr di glucosio	100 ml	nl	2 cucchiaini rasi o 2 bustine
15 gr di glucosio	150 ml	nl	3 cucchiaini rasi o 3 bustine

N.B. Un bicchierino da caffè fino alla fine della zona corrugata contiene 50 ml di liquido, fino all'orlo 80 ml

NO BISCOTTI!!!!!!!!!!

Sottovalutare le iperglicemie in corso di terapia con microinfusore





Non programmare l'attività sportiva




Figura 2. Albero decisionale per l'attività fisica in bambini e ragazzi con diabete di tipo 1 che usano la terapia insulinica multi-iniettiva

Acta Biomed. - Vol. 89 - Quad. 2 - Maggio 2018 | ISSN 0392-4203 **ACTA BIOMEDICA** Official Journal of the Society of Medicine and Natural Sciences of Parma and Centre on health systems' organization, quality and sustainability, Parma, Italy RACCOMANDAZIONI PER LA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FISICO NEL DIABETE TIPO 1 IN ETÀ PEDIATRICA GRUPPO DI STUDIO DI DIABETOLOGIA PEDIATRICA S.I.E.D.P.

IN Camp

Studio prospettico, osservazionale, per la valutazione dell'effetto dell'attività fisica sul controllo glicemico e sulla dose insulinica, durante un campo scuola estivo per bambini affetti da diabete mellito di tipo 1













ACTA BIOMEDICA

ATENEI PARMENSIS | FOUNDED 1887

Official Journal of the Society of Medicine and Natural Sciences of Parma and Centre on health systems' organization, quality and sustainability, Parma, Italy

The Acta Biomedica is indexed by Index Medicus / Medline Excerpta Medica (EMBASE), the Elsevier BioBASE, Scopus (Elsevier) and Bibliovigilance

RACCOMANDAZIONI SULL'UTILIZZO DELLA TECNOLOGIA IN **DIABETOLOGIA PEDIATRICA 2019**



Free on-line www.actabiomedica.it

MATTIOLI 1885

9. DOWNLOAD, TELEMEDICINA, APPS e ADVISORS

Download

Lo scarico dei dati di microinfusori, CGM e FGM all'interno di piattaforme web consente ai pazienti e ai caregivers di visualizzare in pochi secondi i report interattivi con statistiche del controllo glicemico (glicemia media, DS, TIR, % ipoglicemie e iperglicemie, stima della HbA1c), impostazioni del microinfusore (basale, boli, ICR, FSI, IOB) e grafici degli andamenti glicemici (medie orarie, giornaliere). Anche lo staff medico-infermieristico può visionare i dati in remoto o durante la visita ambulatoriale e fornire appropriati consigli terapeutici. Questo modo di gestire i dati consente di migliorare il controllo glicemico e l'HbA1c, ma è sotto-utilizzato dai pazienti (Livello IV, Forza B; Wong 2015, Beck 2015).













Un'ora con AMD-SID-SIE-SIEDP

Supporto tecnologico

METEDA









Un'ora con AMD-SID-SIE-SIEDP



COMITATO SCIENTIFICO

Giacomo Vespasiani, Natalia Visalli, Massimiliano Petrelli, Ivana Rabbone, Salvatore Cannavò



